


VÝSTRAHA:

TENTO VÝROBEK SE NEDOPORUČUJE PRO POUŽITÍ MLADÝM LIDEM A NEKUŘÁKŮM

Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si pozorně celou tento příbalový leták. Obsahuje důležité informace. Tuto příbalovou informaci si uschovejte; možná si ji budete muset přečíst znovu.

NÁVOD NA PLNĚNÍ pro Kanger CLTank v2.



1. Jednou rukou držte nádržku a druhou zatlačte horní víčko dolů a otočte jím proti směru hodinových ručiček.
2. Přidejte e-liquid do komory a dávejte pozor, abyste jej nepřefili.
3. Nasadte horní víčko, nechte několik minut pronikát e-liquid do spirálky a potom použijte výkon uvedený na spirálce.

PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je doporučen pro použití výhradně s plnitelnými elektronickými cigaretami, aby dávky nikotinu odpovídaly vašim osobním požadavkům. Před opětovným naplněním elektronickou cigaretu dobře protřepejte. Tento výrobek nepijte a vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Nádržku uchovávejte těsně uzavřenou ve vodorovné poloze. Skladujte výrobek při okolní teplotě (18-30 °C), mimo dosah přímého slunečního záření. Výrobek NESMÍTE chladit, mrazit a skladovat při teplotě vyšší než 30 °C.

KONTRAINDIKACE Kvůli propylenglykolu:

U pacientů léčených disulfiramem nebo metronidazolem se mohou vyskytnout nežádoucí účinky. Při požití velkého množství propylenglykolu u dětí, těhotných žen a pacientů se selháním jater nebo ledvin může dojít k laktátové acidóze. Osoby, které v minulosti trpěly atopií, alergickou rýmou (sennou rýmou) nebo ekzémem v dětství, mohou být náchylné k rozvoji alergických reakcí.

KVŮLI GLYCEROLU

U starších nebo již dehydratovaných pacientů se zvyšuje pravděpodobnost dehydratace. U pacientů s diabetem musíte dbát zvýšené opatrnosti, protože glycerol může při metabolismu způsobit mírnou hyperglykémii a glykosurii.

SPECIFICKÉ RIZIKOVÉ SKUPINY

Tento výrobek se nedoporučuje pro použití dětem a těhotným nebo kojícím ženám.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Noví uživatelé elektronických cigaret mohou pociťovat sucho v krku, suchý kašel, mírnou bolest nebo podráždění úst nebo dýchacích cest. Pokud se příznaky zhorší nebo trvají déle než 48 hodin, navštivte prosím praktického lékaře a nahlaste výskyt podle následujících informací uvedených v části 11. Možné nežádoucí účinky z vysazení nikotinu – podrážděnost nebo agresivita, pocit slabosti, úzkost, neklid, špatná koncentrace, zvýšená chuť k jídlu nebo přibývání na váze, nutkání kouřit (chuť), noční probuzení nebo poruchy spánku, snížení srdeční frekvence.

ZÁVISLOST

Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou, a proto se nedoporučuje pro použití nekuřákům. Žádná jiná složka tohoto výrobku není známá jako návyková.

TOXICITA

Tento výrobek obsahuje nikotin, který může mít toxické účinky při perorálním požití, zejména u kojenců a dětí. Tento produkt prosím NEPLIJE. V případě jeho požití si vezměte s sebou tento příbalový leták a ihned navštivte praktického lékaře. V případě kontaktu s kůží okamžitě oplachujte studenou tekoucí vodou po dobu alespoň 15 minut.

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

Když se u vás v důsledku používání tohoto výrobku vyskytnou nežádoucí účinky, pomozte nám prosím tím, že nás o nich budete informovat, abychom mohli nadále zlepšovat bezpečnost našich výrobků. Vyplňte prosím online formulář, který je k dispozici na naší webové stránce: www.ivgeliqs.com.

INFORMACE O VÝROBÍ

Tento výrobek vyrábí společnost Acme Vape Ltd. která je registrovaná v Anglii a Walesu, registrační číslo: 10003856 ACME VAPE EUROPE LTD: Unit 19, Seatown Business Campus, Seatown Road, Swords, Co. Dublin, K67 Y673, Ireland Tel: +353 19 643 477.



naskenuj mě

Pokud jste narazili na problém s produktem IVG, navštivte prosím www.ivagegreat.com/pages/contact-and-support nebo naskenujte tento QR kód.