



UPOZORNĚNÍ: TENTO PRODUKT NENÍ VHODNÝ PRO MLADISTVÉ A NEKUŘÁKY.

Před použitím tohoto produktu si prosím nejprve přečtete celý tento leták. Obsahuje důležité informace. Leták si uschovejte, je možné, že ho budete znovu potřebovat.

NÁVOD PRO PLNĚNÍ Na základě Kanger CLTank v2

Použité zařízení je jen pro ilustrační účely. Pro řádný návod k plnění prosím použijte manuál pro zařízení, které používáte. Poznámka: Plnicí otvor Vámi zvoleného modelu by měl být kompatibilní s kapátkem o šířce 2,1 mm a délce 9 mm.

Náhledy zde

- 1) Jednou rukou držte tank a druhou zatlačte na jeho horní část a otočte s ní proti směru hodinových ručiček.
 - 2) Do nádrčky opatrně nalijte e-liquid tak, abyste jej nerozlili.
 - 3) Horní část tanku nasadte zpět a vyčkejte několik minut, než se žhavicí hlava stihne nasáknout e-liquidem.
- Poté tank použijte s doporučeným výkonem uvedeným na žhavicí hlavě.



DOPORUČENÉ POUŽÍVÁNÍ

Tento produkt je určen pouze pro použití s opakovaně plnitelnými elektronickými cigaretami a k inhalaci nikotinu pro osobní potřebu. Důkladně protřepte před naplněním elektronické cigarety. Tento produkt nekonzumujte a vyvarujte se přímému kontaktu s pokožkou.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Nádobu udržujte pevně uzavřenou ve svislé poloze. Produkt skladujte při pokojové teplotě (mezi 18-30°C), mimo přímé sluneční světlo. Neuchovávejte v chladničce nebo mrazničce ani neskladujte při teplotě nad 30°C.

KONTRAINDIKACE kvůli propylenglykolu:

U pacientů léčených disulfiramem nebo metronidazolem se mohou objevit nežádoucí účinky. Při konzumaci velkého množství propylenglykolu dětmi, těhotnými ženami a pacienta se selháním jater nebo ledvin může nastat laktátová acidóza. Jedinci s atopií v anamnéze, alergickou rýmou (senná rýma) nebo dětským ekzémem mohou být náchylní k rozvoji alergických reakcí.

Kvůli glycerolu:

U starších nebo již dehydratovaných pacientů se zvyšuje pravděpodobnost dehydratace. U diabetických pacientů je třeba postupovat opatrně, protože metabolizovaný glycerol může způsobit mírnou hyperglykémii a glykosuri.

SPECIFICKÉ RIZIKOVÉ SKUPINY

Tento produkt není doporučený pro děti, těhotné nebo kojící ženy.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Noví uživatelé elektronických cigaret mohou pociťovat sucho v krku, suchý kašel, mírnou bolest nebo podráždění úst nebo dýchacích cest. Pokud se příznaky zhorší nebo přetrvávají déle než 48 hodin, navštivte praktického lékaře a nahláste svůj případ podle informací uvedených v části 11.

Možné nežádoucí účinky odvykání nikotinu - podrážděnost nebo agresivita, pocit nízké, úzkost, neklid, špatná koncentrace, zvýšená chuť k jídlu nebo přibývání na váze, nutkání kouřit (touha), noční probuzení nebo poruchy spánku, snížení srdeční frekvence.

NÁVYKOVOST

Tento produkt obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou, a proto se pro kuřáky nedoporučuje. Není známo, že by další složka tohoto produktu byla návyková.

TOXICITA

Tento produkt obsahuje nikotin, který může vyvolat toxické účinky, pokud je konzumován orálně, zejména u kojenců a dětí. NEPUŤTE tento produkt. V případě konzumace si prosím vezměte tuto příbalovou informaci s sebou a okamžitě navštivte praktického lékaře. V případě kontaktu s kůží okamžitě opláchněte studenou tekoucí vodou po dobu nejméně 15 minut.

NAHLAŠOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

Pokud v důsledku používání tohoto produktu zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, pomozte nám a informujte nás, abychom mohli nadále zlepšovat bezpečnost našich výrobků. Vyplňte online formulář dostupný na našich webových stránkách: www.ivgeliqids.com. Případně můžete své příznaky nahlásit přímo MHRA pomocí žlutého portálu dostupného na adrese: <https://yellowcard.mhra.gov.uk/yellowcards/tobaccoreportmediator/>

INFORMACE VÝROBCE

Tento produkt vyrábí Acme Vape Ltd., která je registrovanou společností v Anglii a Walesu, registrační číslo: 09023800.