

LOST MARY

TAPPO POD



UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Než začnete tento výrobek používat,
pečlivě si přečtěte tento návod.
www.lostmary.com

UPOZORNĚNÍ
LOST MARY TAPPO 2 ml
Předložená cartridge je
kompatibilní pouze s LOST
MARY TAPPO Zařízením
(v prodeji samostatně).

NÁVOD K POUŽITÍ



1. **ODSTRÁŇTE SAMOLEPKU**



2. **ZATLAČTE DNO CARTRIDGE**



3. **VLOŽTE CARTRIDGE
DO ZAŘÍZENÍ**



4. **PŘÍPRAVENO K POUŽITÍ**

KDY CARTRIDGE VYMĚNIT
Chcete-li zajistit optimální
počitek a chuť, spotřebujte
vyměňte cartridge v
následujících situacích:
Pokud v cartridge už žádný
E-liquid nezbyvá, okamžitě
ukončete vapoání a
cartridge vyměňte, abyste
předšli nepřijemné
spálené chuti.
Pokud nedochází k
produkci páry nebo
nedochází k neuspokojivé
chuť, cartridge nemusí
fungovat správně a je
třeba ji vyměnit.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

1. Chraňte výrobek před
přímým slunečním zářením
a skladujte jej na místě s
teplotním rozsahem 0 až
25 °C.
2. Nevystavujte chladu,
mrazu nebo nadměrnému
teplu.

Chcete-li zajistit optimální
žátek a chuť, spotřebujte
jej co nejdříve po aktivaci
cartridge.

PARAMETRY:
Rozměry: Ø 16,0 x 53,2 mm
Objem cartridge: 2 ml
Zhavicí hlava: Mesh
Odpor žhavicí hlavy: 1,2 Ω

OBSAH BALENÍ:
1 x LOST MARY TAPPO
Prefilil Pod
1 x Uživatelský manuál

**VAROVÁNÍ: TENTO
PRODUKT SE
NEDOPORUČUJE
POUŽÍVAT MLADÝMI
LIDMI A NEKURÁKY**
Nedoporučuje se používat
u dětí, těhotných a kojících
žen.

Než začnete tento výrobek
používat, pečlivě si
přečtěte tento návod.

Tento manuál si uchováte,
protože obsahuje důležité
informace, které můžete
znovu potřebovat.

MOŽNÉ KONTRAINDIKACE

Propan 1,2-diol
• Může vyvolat nežádoucí
účinky u jedinců léčených
disulfiramem nebo
metronidazolem.
• Alergické reakce se
mohou objevit u jedinců s
atopii, dětským ekzémem
nebo rýmou (sená rýma).
• Laktátová acidóza se
může objevit, když velké
množství propylenglykolu
konzumují děti, těhotné
ženy nebo jedinci s
jaterním nebo renálním
selháním.

Glycerol

• Šance na dehydrataci
jsou zvýšené u starších a
již dehydratovaných
jedinců.

• Opatrnosti je třeba dbát
u jedinců s diabetem,
protože metabolismem
glycerol může způsobit
mírnou hyperglykémii nebo
glykosuriu.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

První uživatelé e-cigarety
mohou pociťovat
podráždění úst, suchu v
krku nebo kašel. Pokud
příznaky přetrvávají déle
než 48 hodin nebo se
stanou závažnými,
navštivte praktického
lékaře a nahláste
podrobnosti o incidentu
podle pokynů uvedených v
části „Hlášení nežádoucích
účinků“. Abstinenci účinky
nikotinu se mohou objevit
také při použití
nedostatečné síly k
uspokojení vašich chutí. Ty
mohou zahrnovat
podrážděnost, agresivitu,

pocit slabosti, úzkost,
neklid, špatnou
koncentraci, zvýšenou chuť
k jídlu, nuchání koutit,
poruchy spánku nebo
snížení srdeční frekvence.

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

Pokud v důsledku
používání tohoto výrobku
zaznamenáte jakékoli
negativní vedlejší účinky,
přestaňte jej používat.
Kontaktujte 112.
Toxikologické informační
středisko, Klinika
pracovního lékařství VFN
a. 1. LF UK, Na Bojišti 1,
120 00, Praha, 2. tel.: 224
919 293 a 224 915 402.

NÁVYKOVOST

Tento výrobek obsahuje
nikotin, který je vysoce
návykovou látkou, a proto
se nedoporučuje pro
nekuřáky. Žádná jiná

látky v tomto produktu,
kromě nikotinu, není
známá jako návyková.

TOXICITA

Tento produkt obsahuje
nikotin, který může mít
toxické účinky při
perorálním požití, zejména
u kojenců a dětí. NEPUJE
tento výrobek. V případě
spolknutí okamžitě
navštivte svého
praktického lékaře s tímto
návodem. Pokud dojde k
potřesení pokožky,
okamžitě ji opláchněte
studenou vodou a
pokračujte 10-15 minut.

TENTO MANUÁL SI PROŠIM UCHOVÁTE!

Pro více informací
navštivte stránky:
www.lostmary.com
Kontaktujte nás:
support@lostmary.com

Výrobce:
**IMIRACLE (SHENZHEN)
TECHNOLOGY CO., LTD.**
RM 1606, Bldg. T5, No.
5035 Menghai Ave,
Nanshan District,
Guanhai Cooperation Zone,
Shenzhen, China
☎ +86-755-29875010
✉ www.lostmary.com

EU ODPOVĚDNÁ OSOBA:

GREEN FUN FRANCE
Address: 34 Avenue des
Champs-Élysées, 75008
Paris, France
Email:
support@lostmary.com



@LOSTMARY.Official



@LOSTMARY_GLOBAL



Made in China